AichiSR

植物が作り出す難溶性カルシウム化合物は 痩せ土壤におけるカルシウム貯留の主形態なのか？

佐藤 大地¹, 塩出 晏弓¹, 平野 恭弘¹, 新田 響平², 高濱 謙太朗¹, 岡本透³, 谷川 東子¹

1 名古屋大学, 2 秋田県林業研究研修センター, 3 森林総合研究所

キーワード：森林土壤, 土壤酸性化, 土壤肥沃度, 林業

1. 背景と研究目的

古来より日本文化を長く支えてきたスギ（杉）は、戦後の混乱期には、本来スギの適地ではない「痩せた土壤」にも広く植えられた歴史をもつ。スギは土壤に Ca を多く貯留できる「Ca サイ클ラー」であり[1]、世界的にも珍しいこの力によって、スギは「肥沃な土壤」では、土壤をますます肥沃にするペクトルを発生させる。ところがスギが好まない「痩せた土壤」に成立するスギ林では、Ca 貯留量は減少するという、正のフィードバック現象を起こすことを我々は先行して明らかにしてきた[1]。その理由として、痩せ土壤では「母岩の Ca 濃度が低く、その場には Ca は“スギであっても循環させることができない（無い袖は触れない）”という Ca サイ클ラーの限界があること」や、「植物が落ち葉を使って足元に貯めた Ca は、痩せ土壤は酸性度が高いので、その酸で土壤が洗われ Ca は流されること」などが挙げられる[2]。植物が足元の土壤に貯留する Ca は主に交換性 Ca と考えられているが、交換性以外の土壤における Ca 成分、とくに痩せ土壤で主形態である可能性がある難溶性 Ca 成分については国内外で情報が不足している。そこで「痩せ土壤」・「肥沃土壤」・「とくに肥沃である土壤」という肥沃度傾斜のあるスギ林土壤 Ca の化学状態を、Ca K 吸収端 XANES 分析で明らかにすることを目的とする。

2. 実験内容

「痩せ土壤」に分類される西日本のスギ 6 林分、「肥沃土壤」に分類される西日本のスギ 5 林分、「とくに肥沃であるスギ林土壤」4 林分（秋田県の土壤）、それらの森林のリター、緑落葉、細根、参照物質として有機態 Ca、岩石、モンモリロナイト（粘土）に吸着させた Ca、塩化カルシウム水溶液の 24 種について、透過法または蛍光法にて Ca K 吸収端 XANES 分析を行った。

3. 結果および考察

モンモリロナイトに吸着させた Ca と塩化カルシウム水溶液は類似したスペクトルを有し、両者は Ca 塩を示す点で共通して線形結合フィッティング解析（LCF）に用いることができると推察された（図 1）。土壤と植物体のスペクトルを対象に LCF を行うと Ca 塩を参照した場合に結果の精度が上がるため、Ca 塩が存在すると推察された。さらに土壤と植物体にはペクチン酸 Ca とシュウ酸 Ca が、とくに根にはリグニン様物質と結合している Ca（参照物質としては安息香酸 Ca）の含有があると推察された。今後は土壤の肥沃度傾斜に応じた各成分の含有割合の変動を評価する予定である。

図1 参照物質のCa K吸収端XANESスペクトル

4. 参考文献

1. Tanikawa T, Sobue A, & Hirano Y (2014) For Ecol Manag 334, 284-292. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2014.08.0362>.
2. Tanikawa T, Ito, Y, Fukushima S, Yamashita M, Sugiyama A, Mizoguchi T, Okamoto T, Hirano Y (2017) For Ecol Manag 399, 64-73. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.04.022>